

**Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Erysidoron® 2 und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Erysidoron® 2 beachten?
3. Wie ist Erysidoron® 2 einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Erysidoron® 2 aufzubewahren?



Tabletten

Zusammensetzung

1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Carbo Betulae 10 mg / Sulfur Trit. D1 20 mg.

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Weizenstärke, Calciumbehenat, Mikrokristalline Cellulose.

Erysidoron® 2 ist in Packungen zu 100 und 250 Tabletten erhältlich.

1. Was ist Erysidoron® 2 und wofür wird es angewendet?

Erysidoron® 2 ist ein anthroposophisches Arzneimittel bei Entzündungen von: Weleda AG, Postfach 1309 / 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-424, E-Mail: dialog@weleda.de,
Internet: www.weleda.de

Anwendungsgebiete

gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten nicht sehr heftige (subakute) und chronisch wiederkehrende Entzündungen, z. B. Akne, Furunkulose, Wundrose (Erysipel), Brustdrüsenentzündung (Mastitis).

Bei heftigen (akuten) entzündlichen Hautprozessen sowie bei Fieber, das länger als drei Tage bestehen bleibt oder über 39 °C ansteigt, halten Sie bitte Rücksprache mit einem Arzt; ebenso bei anhaltenden oder häufig wiederkehrenden Beschwerden.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Erysidoron® 2 beachten?

Erysidoron® 2 Tabletten dürfen nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen Weizenstärke.

Die Tabletten sind wegen des Gehaltes an Lactose ungeeignet für Patienten, die an der selten vorkommenden erbten Galactose-Unverträglichkeit (Galactoseintoleranz), einem genetischen Lactasemangel oder einer Glucose-Galactose-Malabsorption leiden.

Kinder

Erysidoron® 2 ist nicht für die Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern im 2. Lebensjahr geeignet, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln während der Schwangerschaft und in der Stillzeit Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von Erysidoron® 2 Tabletten

Weizenstärke kann Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen.

Weizenstärke kann geringe Mengen an Gluten enthalten, die aber auch für Patienten, die an Zöliakie leiden, als verträglich gelten.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. Wie ist Erysidoron® 2 einzunehmen?

Nehmen Sie Erysidoron® 2 Tabletten immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die Tabletten nimmt man mit etwas Wasser ein. Kleinkinder sollten zur leichteren Einnahme die Tabletten zerdrückt erhalten.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

- bei chronisch wiederkehrenden Entzündungen 1 - 3 mal täglich 1 - 2 Tabletten einnehmen.

- im subakuten Stadium gegebenenfalls mit Erysidoron® 1 im stündlichen Wechsel bis zu 6 mal täglich jeweils 1 Tablette einnehmen.

Kleinkinder vom 3. bis zum 6. Lebensjahr erhalten als Einzeldosis 1/2 Tablette, Schulkinder bis zum 12. Lebensjahr 1 Tablette.

Dauer der Anwendung

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde Arzt, insbesondere wenn im subakuten Stadium Erysidoron® 1 und 2 im stündlichen Wechsel eingenommen werden.

Wenn Sie die Einnahme von Erysidoron® 2 vergessen haben: Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel können Erysidoron® 2 Nebenwirkungen haben.

Weizenstärke kann Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

5. Wie ist Erysidoron® 2 aufzubewahren?

Bewahren Sie das Arzneimittel so auf, dass es für Kinder nicht zugänglich ist.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen: Es gibt keine besonderen Anforderungen an die Aufbewahrung.

Stand der Information: Dezember 2003